ANÁLISIS SOBRE CONCIENCIACIÓN, ACCESO Y MEDICIÓN DE LA LP(A) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Se encuestó a un total de 179 especialistas (**23,5% Cardiología**, **55% Medicina Interna**, **11% Endocrinología**, **8,5% Neurología** y **2% otros**) con el objetivo de valorar sus percepciones y experiencia clínica con la lipoproteína (a) en su centro hospitalario.


Se evaluaron aspectos como:

1. **Percepción**
2. **Contexto clínico**
3. **Medición**

76% de los encuestados considera que la **medición de la Lp(a) aporta valor clínico**



84% considera que el riesgo asociado a **niveles altos de Lp(a) es igual o mayor** que el de otros factores de riesgo cardiovascular



91% considera que la Lp(a) elevada es un **factor genético que aumenta el RCV** de forma significativa

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA EVIDENCIA

50% conoce la **última evidencia** sobre Lp(a)

50% considera que necesita **más formación**

74% **no dispone de Lp(a) integrada** en el perfil lipídico habitual

50% **de los encuestados** revalúan los FRCV tras medir Lp(a)




80% de los especialistas realiza **seguimiento** o **ajusta otros factores de riesgo** cuando la **Lp(a) supera los 50-70 mg/dL**

80% realiza una **intensificación del tratamiento hipolipemiante** en función del valor de Lp(a)

Además, se encuestó a **especialistas y jefes del Servicio de Análisis Clínicos** (N= 16) con preguntas específicas que pretendían ahondar aún más en aspectos relacionados con la medición de la Lp(a):

UNIDADES DE MEDICIÓN



55% mg/dL

13% nmol/dL

32% NC (en proceso de cambio de unidades)

La demanda de la determinación ha aumentado un 88% entre 2024 y 2025 según los especialistas en medicina de laboratorio encuestados.

91% de los encuestados **no presenta restricciones** para la determinación de la Lp(a)

Proyecto LipAVAL

Sociedad Valenciana de Cardiología

Sociedad Valenciana de Neurología

Con la colaboración de: Novartis. Reimagining medicine, together.